

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
Session 2012

MATHÉMATIQUES

- Série ES -

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

Durée de l'épreuve : 3 heures

Coefficient : 5

*Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées,
conformément à la réglementation en vigueur.*

Le sujet est composé de 4 exercices indépendants. Le candidat doit traiter tous les exercices. Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un résultat précédemment donné dans le texte pour aborder les questions suivantes, à condition de l'indiquer clairement sur la copie. Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée. Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Avant de composer, le candidat s'assurera que le sujet comporte bien 4 pages numérotées de 1 à 4.

EXERCICE 1 (4 points)

Commun à tous les candidats

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions posées, une seule des trois réponses est exacte.


Pour chaque question, indiquer par a), b) ou c) l'unique bonne réponse. Aucune justification n'est demandée.

Une réponse exacte rapporte 1 point. Une réponse fausse ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $\left[-\frac{5}{2}; 6\right]$.

La courbe C_f tracée ci-dessous, représente la fonction f dans le plan muni d'un repère orthonormé. Le point A a pour coordonnées $(-2; 0)$, le point B a pour coordonnées $(0; 4)$, le point C a pour coordonnées $\left(1; \frac{7}{2}\right)$, le point D a pour coordonnées $(5; 0)$ et le point E a pour coordonnées $(6; 0)$.

On précise que la droite (CE) est tangente à la courbe C_f au point C et que la courbe C_f admet au point B une tangente horizontale.



On note g et h les fonctions définies respectivement par $g(x) = \ln[f(x)]$ et $h(x) = e^{f(x)}$.

1) La fonction g est définie sur l'intervalle :

- a) $]-2; 5[$ b) $[-2; 5]$ c) $\left[-\frac{5}{2}; 6\right]$

2) Le nombre $g(1)$ est égal à :

- a) $\frac{\ln 7}{\ln 2}$ b) $\ln 7 - \ln 2$ c) $\frac{7}{2}$

3) On note f' la fonction dérivée de f , le nombre $f'(1)$ est égal à :

- a) 3,5 b) $-\frac{10}{7}$ c) -0,7

4) On note h' la fonction dérivée de h . Le nombre $h'(0)$ est égal à :

- a) e^0 b) 0 c) e^4

EXERCICE 2 (5 points)*Commun à tous les candidats*

Le tableau suivant donne la proportion de bacheliers ayant obtenu une mention au baccalauréat, série ES, entre 2002 et 2009.

Année	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
Proportion y_i en %	25,5	28,6	30	33,1	36,8	41	41,1	44,1

Source : ministère de l'Education Nationale et ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

1) Calculer le taux d'évolution de la proportion de bacheliers ayant obtenu une mention au baccalauréat ES entre 2002 et 2009. On exprimera le résultat sous forme d'un pourcentage arrondi à l'unité.

2) Dans cette question, on envisage un ajustement affine et on admet qu'une équation de la droite d'ajustement de y en x , obtenue par la méthode des moindres carrés, est $y = 2,73x + 25,47$ (les coefficients étant arrondis à 0,01 près).

En supposant que ce modèle reste valable pour les années suivantes :

- Estimer la proportion de bacheliers susceptibles d'obtenir une mention au baccalauréat ES en 2012.
- Estimer l'année à partir de laquelle la proportion de bacheliers susceptibles d'obtenir une mention au baccalauréat ES dépassera 60 %.

3) Dans cette question, on envisage un ajustement exponentiel et on pose $z = \ln y$.

- Recopier et compléter le tableau suivant. Les résultats seront arrondis à 10^{-3} près.

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
$z_i = \ln y_i$								

- À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement de z en x , obtenue par la méthode des moindres carrés. Les coefficients seront arrondis à 0,01 près.
- En déduire que $y = A \times B^x$ où A et B sont deux nombres réels à déterminer. On arrondira à 0,01 près.
- En supposant que ce modèle reste valable pour les années suivantes, calculer la proportion, arrondie à 0,1 %, de bacheliers susceptibles d'obtenir une mention au baccalauréat ES en 2012.

EXERCICE 3 (5 points)

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

Un sondage a été effectué auprès des anciens élèves d'un lycée quelques années après l'obtention de leur baccalauréat.

Ce sondage révèle que 55 % d'entre eux poursuivent leurs études à la faculté, 10 % ont intégré une école d'ingénieur et le pourcentage restant est sur le marché du travail (en activité ou en recherche d'emploi).

Ce sondage révèle aussi que :

- 45 % des anciens élèves qui poursuivent leurs études à la faculté ont fait le choix de vivre en colocation ;
- 30 % des anciens élèves qui ont intégré une école d'ingénieur ont fait le choix de vivre en colocation ;
- 15 % des anciens élèves sur le marché du travail ont fait le choix de vivre en colocation.

On interroge au hasard un ancien élève du lycée et on note :

F l'évènement : « l'ancien élève poursuit ses études à la faculté » ;

I l'évènement : « l'ancien élève a intégré une école d'ingénieur » ;

T l'évènement : « l'ancien élève est sur le marché du travail » ;

C l'évènement : « l'ancien élève vit en colocation ».

1) Construire un arbre pondéré décrivant la situation.

2) a) Exprimer à l'aide d'une phrase l'évènement $F \cap C$ puis calculer la valeur exacte de sa probabilité.

b) Montrer que la probabilité de l'évènement C est égale à 0,33.

3) Un ancien élève vit en colocation. Calculer la probabilité qu'il poursuive ses études à la faculté.

4) *Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.*

Le responsable du sondage affirme : « Plus de la moitié des élèves n'ayant pas fait le choix de la colocation poursuivent des études ». Cette affirmation est-elle correcte ? Justifier.

5) On interroge au hasard trois anciens élèves. On suppose que le nombre d'anciens élèves est suffisamment important pour considérer que ce choix est fait de manière indépendante.

Calculer la probabilité pour qu'au moins un des anciens élèves vive en colocation. On arrondira le résultat à 10^{-2} près.

EXERCICE 4 (6 points)

Commun à tous les candidats

Partie A

Soit f la fonction définie sur \mathbf{R} par $f(x) = (ax + b) e^{-x}$ où a et b sont deux nombres réels. On note f' la fonction dérivée de f .

- 1) Montrer que pour tout nombre réel x , $f'(x) = (a - b - ax) e^{-x}$.
- 2) On donne $f(0) = 1$ et $f'(0) = 3$. En déduire a et b .

Partie B

Dans cette partie, on admettra que $a = 4$ et $b = 1$. Donc pour tout réel x , $f(x) = (4x + 1) e^{-x}$.

- 1) Déterminer la limite de f en $-\infty$.
- 2) Déterminer la limite de f en $+\infty$. (On pourra utiliser le fait que pour tout réel x , $f(x) = \frac{4x}{e^x} + \frac{1}{e^x}$).
- 3) Etudier le sens de variation de f sur \mathbf{R} .

Partie C

Une entreprise produit x centaines d'objets chaque semaine.

Le coût de production, exprimé en milliers d'euros, est défini sur l'intervalle $[0 ; 5]$ par la fonction f étudiée dans la **partie B**.

- 1) Quel est le coût de production maximal hebdomadaire ? On arrondira le résultat à l'euro près.
- 2) Démontrer que la fonction F définie sur $[0 ; 5]$ par $F(x) = (-4x - 5) e^{-x}$ est une primitive de la fonction f sur ce même intervalle.
- 3) a) Calculer $\frac{1}{5} \int_0^5 f(x) dx$. On arrondira le résultat à 10^{-3} près.
b) Quelle interprétation peut-on faire du résultat précédent pour l'entreprise ?

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Session 2012

MATHÉMATIQUES

- Série ES -

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

Durée de l'épreuve : 3 heures

Coefficient : 7

*Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées,
conformément à la réglementation en vigueur.*

Le sujet est composé de 4 exercices indépendants. Le candidat doit traiter tous les exercices. Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un résultat précédemment donné dans le texte pour aborder les questions suivantes, à condition de l'indiquer clairement sur la copie. Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée. Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Avant de composer, le candidat s'assurera que le sujet comporte bien 4 pages numérotées de 1 à 4.

EXERCICE 1 (4 points)

Commun à tous les candidats

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions posées, une seule des trois réponses est exacte.


Pour chaque question, indiquer par a), b) ou c) l'unique bonne réponse. Aucune justification n'est demandée.

Une réponse exacte rapporte 1 point. Une réponse fausse ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $\left[-\frac{5}{2}; 6\right]$.

La courbe C_f tracée ci-dessous, représente la fonction f dans le plan muni d'un repère orthonormé. Le point A a pour coordonnées $(-2; 0)$, le point B a pour coordonnées $(0; 4)$, le point C a pour coordonnées $\left(1; \frac{7}{2}\right)$, le point D a pour coordonnées $(5; 0)$ et le point E a pour coordonnées $(6; 0)$.

On précise que la droite (CE) est tangente à la courbe C_f au point C et que la courbe C_f admet au point B une tangente horizontale.



On note g et h les fonctions définies respectivement par $g(x) = \ln[f(x)]$ et $h(x) = e^{f(x)}$.

1) La fonction g est définie sur l'intervalle :

- a) $]-2; 5[$ b) $[-2; 5]$ c) $\left[-\frac{5}{2}; 6\right]$

2) Le nombre $g(1)$ est égal à :

- a) $\frac{\ln 7}{\ln 2}$ b) $\ln 7 - \ln 2$ c) $\frac{7}{2}$

3) On note f' la fonction dérivée de f , le nombre $f'(1)$ est égal à :

- a) 3,5 b) $-\frac{10}{7}$ c) $-0,7$

4) On note h' la fonction dérivée de h . Le nombre $h'(0)$ est égal à :

- a) e^0 b) 0 c) e^4

EXERCICE 2 (5 points)

Commun à tous les candidats

Le tableau suivant donne la proportion de bacheliers ayant obtenu une mention au baccalauréat, série ES, entre 2002 et 2009.

Année	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
Proportion y_i en %	25,5	28,6	30	33,1	36,8	41	41,1	44,1

Source : ministère de l'Education Nationale et ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

1) Calculer le taux d'évolution de la proportion de bacheliers ayant obtenu une mention au baccalauréat ES entre 2002 et 2009. On exprimera le résultat sous forme d'un pourcentage arrondi à l'unité.

2) Dans cette question, on envisage un ajustement affine et on admet qu'une équation de la droite d'ajustement de y en x , obtenue par la méthode des moindres carrés, est $y = 2,73x + 25,47$ (les coefficients étant arrondis à 0,01 près).

En supposant que ce modèle reste valable pour les années suivantes :

- Estimer la proportion de bacheliers susceptibles d'obtenir une mention au baccalauréat ES en 2012.
- Estimer l'année à partir de laquelle la proportion de bacheliers susceptibles d'obtenir une mention au baccalauréat ES dépassera 60 %.

3) Dans cette question, on envisage un ajustement exponentiel et on pose $z = \ln y$.

- Recopier et compléter le tableau suivant. Les résultats seront arrondis à 10^{-3} près.

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
$z_i = \ln y_i$								

- À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement de z en x , obtenue par la méthode des moindres carrés. Les coefficients seront arrondis à 0,01 près.
- En déduire que $y = A \times B^x$ où A et B sont deux nombres réels à déterminer. On arrondira à 0,01 près.
- En supposant que ce modèle reste valable pour les années suivantes, calculer la proportion, arrondie à 0,1 %, de bacheliers susceptibles d'obtenir une mention au baccalauréat ES en 2012.

EXERCICE 3 (5 points)

Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

Au rugby, réussir une transformation consiste à faire passer le ballon entre deux poteaux verticaux et au dessus de la barre horizontale reliant ces deux poteaux.

Basile est un joueur de rugby, il envisage de devenir professionnel.

Ses différentes expériences en championnat conduisent aux résultats suivants :

- Lors d'un match, la probabilité que Basile réussisse la première transformation est égale à 0,5,
- Si Basile réussit une transformation, la probabilité qu'il réussisse la transformation suivante est égale à 0,8,
- Si Basile ne réussit pas une transformation, la probabilité qu'il réussisse la transformation suivante est égale à 0,6.

Basile se prépare pour son match de sélection en tant que professionnel.

On considère que lors du match, n transformations sont tentées avec n entier naturel supérieur ou égal à 1.

On note T l'état : « Basile réussit sa transformation ».

Pour $n \geq 1$, on note :

- p_n la probabilité que Basile réussisse la n -ième transformation,
- q_n la probabilité que Basile ne réussisse pas la n -ième transformation,
- $P_n = \begin{pmatrix} p_n & q_n \end{pmatrix}$ la matrice ligne donnant l'état probabiliste lors de la n -ième transformation.

On a : $P_1 = (0,5 \quad 0,5)$.

Partie A

- 1) Représenter la situation à l'aide d'un graphe probabiliste de sommets T et \bar{T} .
- 2) Donner la matrice de transition M de ce graphe probabiliste.
- 3) Déterminer l'état probabiliste P_2 .

Partie B

- 1) a) En utilisant l'égalité $P_{n+1} = P_n \times M$, montrer que $p_{n+1} = 0,8p_n + 0,6q_n$.
b) En déduire que pour tout $n \geq 1$, $p_{n+1} = 0,2p_n + 0,6$.
- 2) Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \geq 1$ par $u_n = p_n - 0,75$.
 - a) Démontrer que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison 0,2.
 - b) En déduire que la suite (p_n) converge et donner sa limite.
 - c) Interpréter le résultat précédent.

EXERCICE 4 (6 points)

Commun à tous les candidats

Partie A

Soit f la fonction définie sur \mathbf{R} par $f(x) = (ax + b) e^{-x}$ où a et b sont deux nombres réels. On note f' la fonction dérivée de f .

- 1) Montrer que pour tout nombre réel x , $f'(x) = (a - b - ax) e^{-x}$.
- 2) On donne $f(0) = 1$ et $f'(0) = 3$. En déduire a et b .

Partie B

Dans cette partie, on admettra que $a = 4$ et $b = 1$. Donc pour tout réel x , $f(x) = (4x + 1) e^{-x}$.

- 1) Déterminer la limite de f en $-\infty$.
- 2) Déterminer la limite de f en $+\infty$. (On pourra utiliser le fait que pour tout réel x , $f(x) = \frac{4x}{e^x} + \frac{1}{e^x}$).
- 3) Etudier le sens de variation de f sur \mathbf{R} .

Partie C

Une entreprise produit x centaines d'objets chaque semaine.

Le coût de production, exprimé en milliers d'euros, est défini sur l'intervalle $[0 ; 5]$ par la fonction f étudiée dans la **partie B**.

- 1) Quel est le coût de production maximal hebdomadaire ? On arrondira le résultat à l'euro près.
- 2) Démontrer que la fonction F définie sur $[0 ; 5]$ par $F(x) = (-4x - 5) e^{-x}$ est une primitive de la fonction f sur ce même intervalle.
- 3) a) Calculer $\frac{1}{5} \int_0^5 f(x) dx$. On arrondira le résultat à 10^{-3} près.
b) Quelle interprétation peut-on faire du résultat précédent pour l'entreprise ?