

CORRECTION DU BAC 2007

Terminale S

Amérique du Nord

Exercice 1

1) Soit (P) le plan dont une équation est : $2x + y - 3z + 1 = 0$. Alors \vec{n} , de coordonnées $(2 ; 1 ; -3)$, est un vecteur normal de (P).

Comme H est le projeté orthogonal de A sur (P), alors \overline{AH} et \vec{n} sont colinéaires. Il existe

donc un réel k tel que $\overline{AH} = k \vec{n}$, c'est-à-dire
$$\begin{cases} x_H - 1 = 2k \\ y_H - 11 = k \\ z_H - 7 = -3k \end{cases} \text{ ou encore } \begin{cases} x_H = 1 + 2k \\ y_H = 11 + k \\ z_H = 7 - 3k \end{cases} \quad (1).$$

De plus, H appartient à (P), alors : $2(1 + 2k) + (11 + k) - 3(7 - 3k) + 1 = 0$; d'où :

$14k - 7 = 0$. On en déduit que $k = \frac{1}{2}$.

En remplaçant dans (1), on obtient :
$$\begin{cases} x_H = 2 \\ y_H = \frac{23}{2} \\ z_H = \frac{11}{2} \end{cases}.$$

La proposition 1 est donc fautive.

Autre justification : Soit (P) le plan dont une équation est : $2x + y - 3z + 1 = 0$. Alors \vec{n} , de coordonnées $(2 ; 1 ; -3)$, est un vecteur normal de (P).

On remarque que H $(0 ; 2 ; 1)$ appartient à (P) car $2 \times 0 + 2 - 3 \times 1 + 1 = 0$.

De plus, le vecteur \overline{AH} a pour coordonnées $(-1 ; -9 ; -6)$.

$\frac{x_{\overline{AH}}}{x_{\vec{n}}} = -\frac{1}{2}$; $\frac{y_{\overline{AH}}}{y_{\vec{n}}} = -9$ et $\frac{z_{\overline{AH}}}{z_{\vec{n}}} = 2$; comme les coordonnées des vecteurs \overline{AH} et \vec{n} ne

sont pas proportionnelles, alors \overline{AH} et \vec{n} ne sont pas colinéaires.

Par conséquent, **le point H ne peut pas être le projeté orthogonal de A sur (P).**

2) Les solutions de l'équation différentielle (E) sont les fonctions définies sur \mathbf{R} par

$x \mapsto Ce^{-2x} - \frac{2}{-2} = Ce^{-2x} + 1$, où C est une constante réelle.

Comme u est la solution de (E) vérifiant $u(0) = 0$, alors $Ce^0 + 1 = 0$, c'est-à-dire $C = -1$.

Donc $u(x) = -e^{-2x} + 1$.

On en déduit que : $u\left(\frac{\ln 2}{2}\right) = -e^{-\ln 2} + 1 = -e^{\ln\left(\frac{1}{2}\right)} + 1 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$.

La proposition 2 est donc vraie.

3) Soit $\mathcal{P}(n)$ la proposition : « pour tout n de \mathbf{N} , $0 \leq u_n \leq 7$ »

→ Comme $u_0 = 2$, alors on a $\mathcal{P}(0)$ qui est vraie.

→ Montrons que pour tout $n \geq 1$, on a : $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$.

Soit $n \geq 1$. Supposons que $\mathcal{P}(n)$ est vraie. Alors : $0 \leq u_n \leq 7$.

En multipliant les membres de l'inégalité précédente par 7, on obtient : $0 \leq 7u_n \leq 49$.

Comme la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$, donc sur $[0 ; 49]$, alors

$\sqrt{0} \leq \sqrt{7u_n} \leq \sqrt{49}$, c'est-à-dire $0 \leq u_{n+1} \leq 7$.

On en déduit que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

On a alors prouvé :

$\mathcal{P}(0)$ et pour tout n supérieur ou égal à 1, $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$.

→ Du principe de raisonnement par récurrence, on déduit :

pour tout n supérieur ou égal à 1, $\mathcal{P}(n)$ est vraie

C'est-à-dire : pour tout n de \mathbf{N} , $0 \leq u_n \leq 7$.

La proposition 3 est donc vraie.

Exercice 2

1) a) L'écriture complexe de la r est de la forme $z' - z_0 = e^{i\frac{2\pi}{3}}(z - z_0)$, c'est-à-dire

$$z' = e^{i\frac{2\pi}{3}} z.$$

b) Comme C est l'image de B par r , alors $z_C = z_B e^{i\frac{2\pi}{3}} = e^{-i\frac{5\pi}{6}} \times e^{i\frac{2\pi}{3}} = e^{i\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{5\pi}{6}\right)} = e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

Donc l'affixe de C est $e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

$$c) z_B = e^{-i\frac{5\pi}{6}} = \cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

$$z_C = e^{-i\frac{\pi}{6}} = \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

d) Voir la figure à la fin de l'exercice.

2) a) Comme D est le barycentre des points A , B et C affectés respectivement des coefficients 2, -1 et 2, alors on peut écrire :

$$z_D = \frac{2z_A - z_B + 2z_C}{2 - 1 + 2} = \frac{2i + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i + \sqrt{3} - i}{3} = \frac{3\sqrt{3} + 3i}{3}.$$

Par conséquent, $z_D = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$.

b) $OA = |z_A - z_0| = |i| = 1$; $OB = |z_B - 0| = \left|e^{-i\frac{5\pi}{6}}\right| = 1$; $OC = |z_C - 0| = \left|e^{-i\frac{\pi}{6}}\right| = 1$ et

$$OD = |z_D - z_0| = \left|\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right| = 1.$$

Par conséquent, **les points A , B , C et D sont sur le cercle de centre O et de rayon 1.**

3) a) L'écriture complexe de h est de la forme $z' - z_A = 2(z - z_A)$, c'est-à-dire $z' = 2z - i$.

b) Comme E est l'image de D par h , alors $z_E = 2z_D - i = \sqrt{3} + i - i = \sqrt{3}$.

Par conséquent, l'affixe de E est $z_E = \sqrt{3}$.

$$4) a) \frac{z_D - z_C}{z_E - z_C} = \frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)}{\sqrt{3} - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)} = \frac{i}{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i} = \frac{i\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)} = \frac{\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}}{1}.$$


Par conséquent, $\frac{z_D - z_C}{z_E - z_C} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$.

$$b) \frac{CD}{CE} = \frac{|z_D - z_C|}{|z_E - z_C|} = \left| \frac{z_D - z_C}{z_E - z_C} \right|. \text{ Or, } \frac{z_D - z_C}{z_E - z_C} = e^{i\frac{\pi}{3}} \text{ d'après la question précédente.}$$

D'où : $\frac{CD}{CE} = \left| e^{i\frac{\pi}{3}} \right| = 1$, et par suite $CD = CE$. On en déduit que CDE est isocèle en C .

De plus, $(\overrightarrow{CE}, \overrightarrow{CD}) = \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_E - z_C}\right) = \arg\left(e^{i\frac{\pi}{3}}\right) = \frac{\pi}{3}$.

Par conséquent, **le triangle CDE est équilatéral.**



Exercice 3

1) a) Comme le joueur réalise trois parties, **les valeurs que peut prendre X sont : 0 ; 1 ; 2 et 3.**

$$b) \triangleright p(X=2) = p(\overline{E_1} \cap E_2 \cap E_3) + p(E_1 \cap \overline{E_2} \cap E_3) + p(E_1 \cap E_2 \cap \overline{E_3}).$$

D'après l'arbre pondéré suivant, on en déduit que :


$$p(X=2) = 0,8 \times 0,05 \times 0,1 + 0,2 \times 0,9 \times 0,05 + 0,2 \times 0,1 \times 0,9 = 0,031.$$

Par conséquent, **la probabilité de l'événement $(X=2)$ est égale à 0,031.**

$\triangleright p(X=3) = p(E_1 \cap E_2 \cap E_3)$. D'après l'arbre pondéré suivant, on en déduit que :

$$p(X=3) = 0,2 \times 0,2 \times 0,1 = 0,002.$$

Par conséquent, **la probabilité de l'événement $(X=3)$ est égale à 0,002.**



d) $p(X=0) = p(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2 \cap \bar{E}_3) = 0,8 \times 0,95 \times 0,95 = 0,722$

$p(X=1) = p(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2 \cap E_3) + p(\bar{E}_1 \cap E_2 \cap \bar{E}_3) + p(E_1 \cap \bar{E}_2 \cap \bar{E}_3) = 0,245.$

La loi de probabilité de X est donc :

x_i	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	0,722	0,245	0,031	0,002

d) $E(X) = 0 \times 0,722 + 1 \times 0,245 + 2 \times 0,031 + 3 \times 0,002 = \mathbf{0,313}.$

2) a) $p(E_n \cap E_{n+1}) = p_{E_n}(E_{n+1}) \times p(E_n).$

Or $p_{E_n}(E_{n+1})$ est la probabilité qu'il perde la $(n+1)$ ième partie sachant qu'il a perdu la n ième partie ; elle est donc égale à 0,1. De plus, $p(E_n) = p_n.$

Par conséquent, $p(E_n \cap E_{n+1}) = p_n \cdot 0,1.$

$p(\bar{E}_n \cap E_{n+1}) = p_{\bar{E}_n}(E_{n+1}) \times p(\bar{E}_n).$

Or $p_{\bar{E}_n}(E_{n+1})$ est la probabilité qu'il perde la $(n+1)$ ième partie sachant qu'il a gagné la n ième partie ; elle est donc égale à 0,05. De plus, $p(\bar{E}_n) = 1 - p(E_n) = 1 - p_n.$

Par conséquent, $p(\bar{E}_n \cap E_{n+1}) = 0,05(1 - p_n).$

b) E_n et \bar{E}_n forment une partition de l'univers, alors d'après la formule des probabilités totales, $p(E_{n+1}) = p(E_n \cap E_{n+1}) + p(\bar{E}_n \cap E_{n+1}) = 0,1p_n + 0,05(1 - p_n) = 0,05p_n + 0,05.$

Par conséquent, $p_{n+1} = 0,05p_n + 0,05$, pour tout entier naturel n non nul.

3) a) Soit n un entier naturel non nul :

$$u_{n+1} = p_{n+1} - \frac{1}{19} = 0,05p_n + 0,05 - \frac{1}{19} = 0,05p_n - \frac{1}{380} = 0,05 \left(p_n - \frac{1}{380 \times 0,05} \right) = 0,05 \left(p_n - \frac{1}{19} \right) = 0,05u_n$$

Par conséquent, **la suite (u_n) est une suite géométrique de raison 0,05 et de premier**

terme $u_1 = p_1 - \frac{1}{19} = 0,2 - \frac{1}{19} = \frac{14}{95}$.

b) D'après la question précédente, on en déduit que, pour **tout entier naturel n non nul**,

$$u_n = \frac{14}{95} \times (0,05)^{n-1}, \text{ et par suite, } p_n = u_n + \frac{1}{19} = \frac{14}{95} \times (0,05)^{n-1} + \frac{1}{19}.$$

c) $(0,05)^{n-1} = \frac{(0,05)^n}{0,05}$. Or $-1 < 0,05 < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (0,05)^n = 0$; d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(0,05)^n}{0,05} = 0$.

Par conséquent, $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{1}{19}$.

Exercice 4 (Amérique du Nord, juin 2006)

1) **Restitution organisée de connaissances.**

a) La fonction g est dérivable sur $[0 ; +\infty[$ en tant que somme de deux fonctions $x \mapsto e^x$ et

$x \mapsto -\frac{x^2}{2}$ dérivables sur \mathbf{R} , donc sur $[0 ; +\infty[$.

Pour tout réel x strictement positif, $g'(x) = e^x - x$.

Or, pour tout réel x , on a : $e^x > x$. On en déduit que $g'(x) > 0$ pour tout réel x .

Par conséquent, la fonction g est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

De plus, $g(0) = e^0 - 0 = 1$, on peut conclure que la fonction g est strictement positive sur $[0 ; +\infty[$.

Par conséquent, **pour tout x de $[0 ; +\infty[$, $g(x) \geq 0$.**

b) D'après la question précédente, on peut écrire que, pour tout x de $[0 ; +\infty[$, $e^x - \frac{x^2}{2} \geq 0$,

c'est-à-dire $e^x \geq \frac{x^2}{2}$. Si x est un réel strictement positif, alors $\frac{e^x}{x} \geq \frac{x}{2}$.

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} = +\infty$, donc d'après le théorème de comparaison, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

2) a) Comme $e^{-\frac{x}{2}} > 0$ pour tout réel x , et que $\frac{1}{4}x \geq 0$ pour tout x de $[0 ; +\infty[$.

Par conséquent, **f est positive sur $[0 ; +\infty[$.**

b) $f(x) = \frac{1}{4} x e^{-\frac{x}{2}} = \frac{1}{4} \frac{x}{e^{\frac{x}{2}}} = \frac{1}{2} \times \frac{\frac{x}{2}}{e^{\frac{x}{2}}} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\frac{e^{\frac{x}{2}}}{\frac{x}{2}}}$.

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} = +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, d'après la limite d'une fonction composée,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{x}{2}}}{\frac{x}{2}} = +\infty. \text{ D'où : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{e^{\frac{x}{2}}}{\frac{x}{2}}} = 0. \text{ Par conséquent, } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

On en déduit que **la courbe (C) admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$.**

c) La fonction $x \mapsto e^{-\frac{x}{2}}$ est dérivable sur \mathbf{R} en tant que composée de la fonction $x \mapsto -\frac{x}{2}$, dérivable sur \mathbf{R} , et de la fonction exponentielle dérivable sur \mathbf{R} .

La fonction $x \mapsto \frac{x}{4}$, dérivable sur \mathbf{R} .

Par conséquent, la fonction f est dérivable sur \mathbf{R} en tant que produit de deux fonctions dérivables sur \mathbf{R} .

On a : $f = u \times e^v$ avec $u(x) = \frac{1}{4}x$ et $v(x) = -\frac{1}{2}x$.

Alors : $f' = u' \times e^v + u \times v'e^v$ avec $u'(x) = \frac{1}{4}$ et $v'(x) = -\frac{1}{2}$.

D'où : $f'(x) = \frac{1}{4} \times e^{-\frac{x}{2}} + \frac{x}{4} \times \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-\frac{x}{2}} = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{x}{2}\right) e^{-\frac{x}{2}}$, pour tout réel x strictement positif.

Comme $\frac{1}{4} e^{-\frac{x}{2}} > 0$ pour tout réel x strictement positif, le signe de f' dépend de celui de $\left(1 - \frac{x}{2}\right)$

Or $1 - \frac{x}{2} = 0 \Leftrightarrow x = 2$, $1 - \frac{x}{2} > 0 \Leftrightarrow x < 2$ et $1 - \frac{x}{2} < 0 \Leftrightarrow x > 2$.

Par conséquent, **la fonction f est croissante sur $]-\infty ; 2]$ et est décroissante sur $[2 ; +\infty[$.**

On en déduit que :

x	0	2	$+\infty$
signe de $f'(x)$	+	0	-
variations de f	0	$\frac{1}{2e}$	0

$$f(0) = \frac{1}{4} \times 0 \times e^0 = 0 \text{ et } f(2) = \frac{2}{4} e^{-1} = \frac{1}{2e}.$$

3) a) La fonction f est dérivable sur $[0 ; +\infty[$, donc continue sur $[0 ; +\infty[$.

La fonction F est donc la primitive de f sur $[0 ; +\infty[$ qui s'annule en 0.

Alors, pour tout réel x positif, $F'(x) = f(x)$. Or, d'après la question 2) a), f est positive sur $[0 ; +\infty[$. Par conséquent, **la fonction F est croissante sur $[0 ; +\infty[$.**

$$b) F(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x \left(\frac{1}{4} t e^{-\frac{t}{2}} \right) dt = \frac{1}{4} \int_0^x \left(t e^{-\frac{t}{2}} \right) dt.$$

$$\text{Posons } \begin{cases} u(t) = t \\ v'(t) = e^{-\frac{t}{2}} \end{cases} \text{ Alors } \begin{cases} u'(t) = 1 \\ v'(t) = -2e^{-\frac{t}{2}} \end{cases}.$$

Les fonctions $u'v$, uv' et $(uv)'$ sont continues et dérivables sur $[0; +\infty[$, d'après la méthode de l'intégration par parties :

$$\int_0^x \left(t e^{-\frac{t}{2}} \right) dt = \left[-2t e^{-\frac{t}{2}} \right]_0^x - \int_0^x -2e^{-\frac{t}{2}} dt = \left[-2t e^{-\frac{t}{2}} \right]_0^x + 2 \left[-2e^{-\frac{t}{2}} \right]_0^x = -2xe^{-\frac{x}{2}} - 4e^{-\frac{x}{2}} + 4.$$

$$\text{Par conséquent, } F(x) = \frac{1}{4} \left(-2xe^{-\frac{x}{2}} - 4e^{-\frac{x}{2}} + 4 \right) = 1 - e^{-\frac{x}{2}} - \frac{1}{2} xe^{-\frac{x}{2}}.$$

c) D'après la question 2) b), $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} e^{-\frac{x}{2}} = 0.$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{x}{2} = -\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, d'après la limite d'une fonction composée,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\frac{x}{2}} = 0. \text{ Par somme des limites des fonctions, on en déduit que : } \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

D'après la question 3) a), on a le tableau de variation suivant :

x	0	$+\infty$
signe de $F'(x)$	0	+
variations de F	0	1

d) D'après la question précédente, la fonction F est continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$, que $F(0) < 0,5$ et $F(1) > 0,5$, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, l'équation $F(x) = \frac{1}{2}$ admet une seule solution α dans $[0; +\infty[$.

En utilisant la calculatrice, on obtient :

x	$f(x)$
0	0
1	0,09020401
2	0,26424112
3	0,4421746
4	0,59399415
5	0,7127025
6	0,80085173
7	0,86411177
8	0,90842181
9	0,93890052
10	0,95957232

x	$f(x)$
3	0,4421746
3,1	0,45876767
3,2	0,47506905
3,3	0,49106774
3,4	0,50675449
3,5	0,52212166
3,6	0,53716311
3,7	0,55187408
3,8	0,566251
3,9	0,58029149
4	0,59399415

x	$f(x)$
3,3	0,49106774
3,31	0,49265059
3,32	0,49423031
3,33	0,4958069
3,34	0,49738033
3,35	0,49895062
3,36	0,50051774
3,37	0,5020817
3,38	0,50364248
3,39	0,50520008
3,4	0,50675449

pas = 0,1

pas = 0,1

pas = 0,01

donc $3 < \alpha < 4$

donc $3,3 < \alpha < 3,4$

donc $3,35 < \alpha < 3,36$

Par conséquent, **une valeur approchée de α à 10^{-2} près par excès est 3,36.**

4) Comme la fonction f est positive sur $[0 ; +\infty[$, donc sur $[0 ; n]$ (n étant un entier naturel non nul), alors l'aire A_n en unités d'aire de la partie du plan située entre l'axe des abscisses, la courbe (C) et les droites d'équations $x=0$ et $x=n$, est égale à $A_n = \int_0^n f(t) dt = F(n)$.

Alors $A_n \geq 0,5$ équivaut à $F(n) \geq 0,5$, c'est-à-dire à $F(n) \geq F(\alpha)$.

Comme la fonction F est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$, $A_n \geq 0,5$ équivaut à $n \geq \alpha$.

Par conséquent, **le plus petit entier naturel n tel que $A_n \geq 0,5$ est 4.**